

# プラミペキソール塩酸塩 LA錠 MI「アメル」 を服用される方へ

このお薬を正しく服用するために  
**飲む前に** 必ず読んでください。

このお薬を飲むと、次のような症状があらわれることがあります。

- **前ぶれもなく急に眠りこむ**
- **眠くなる**
- **めまい**
- **立ちくらみ**
- **ふらつき**



このため、**車の運転や危険を伴う機械の操作、高いところでの作業などは行わないでください。**

このような症状があらわれた場合には、  
医師または薬剤師に相談してください。

(裏面も必ずご覧ください)

A99111KN

このお薬は  
**「徐放錠(LA錠)」**  
です。

プラミペキソール塩酸塩錠を既に  
服用中の方は、医師の指示にしたがい、  
正しく服用してください。

## 医師の指示なしに、飲む量を変えたり、 飲むのを止めたりしないでください。

次のような症状があらわれた場合も、  
医師・薬剤師に相談してください。

- **衝動制御障害** 欲求や行動を抑えるのが難しくなる  
(病的賭博、病的性欲亢進、強迫性購買、暴食)
- **幻覚** 実際にはないものが見えたり聞こえる感じがする
- **妄想** 根拠のない思い込みや非現実的なことを確信する
- **意識が混乱したり、うすれる**
- **38℃以上の発熱**
- **筋肉がこわばる**



ここには、このお薬について特に注意していただきたいことだけを書いています。他にこのお薬について分からないことがあれば医師または薬剤師に相談してください。