

先発権・特許権のある効能の承認取得状況(2018年9月27日更新)

共和製品名	先発製品名	効能・効果（共和製品になく、先発製品にある効能）など	当社の承認取得予定年月日
アリピプラゾール錠3mg, 6mg, 12mg, 24mg, 散1%「アメル」 アリピプラゾールOD錠3mg, 6mg, 12mg, 24mg「アメル」 アリピプラゾール内用液3mg分包, 6mg分包, 12mg分包「タカタ」	エビリファイ錠3mg, 6mg, 12mg, 散1% エビリファイOD錠3mg, 6mg, 12mg, 24mg エビリファイ内用液0.1%	双極性障害における躁症状の改善	未定 (特許期間:2025年6月17日まで)
		うつ病・うつ状態(既存治療で十分な効果が認められない場合に限る) ※エビリファイOD錠24mgは除く	未定 (特許期間:2026年8月1日まで)
		小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性 ※エビリファイOD錠24mgは除く	未定 (特許期間:2026年7月16日まで)
エダラボン点滴静注バッグ30mg「アメル」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制	未定 (再審査期間:2025年6月25日まで)
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg, OD錠5mg, OD錠10mg, 錠3mg, 錠5mg, 錠10mg, 細粒0.5%「アメル」	アリセプトD錠3mg, D錠5mg, D錠10mg, 錠3mg, 錠5mg, 錠10mg, 細粒0.5%	レビー小体型認知症における認知症状の進行抑制	申請中 (再審査期間:2018年9月18日まで)
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg, 50mg, 75mg「アメル」	デプロメール錠25, 50, 75 ルボックス錠25, 50, 75	【用法・用量】 小児への投与:強迫性障害 通常、8歳以上の小児には、フルボキサミンマレイン酸塩として、1日1回25mgの就寝前経口投与から開始する。その後1週間以上の間隔をあけて1日50mgを1日2回朝及び就寝前に経口投与する。年齢・症状に応じて1日150mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として25mgずつ行うこと。	未定 (再審査期間:2021年7月2日まで)
ピタバスタチンCa錠1mg, 錠2mg「アメル」	リバロ錠1mg, 錠2mg	【用法・用量】 小児:通常、10歳以上の小児にはピタバスタチンカルシウムとして1mgを1日1回経口投与する。 なお、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日2mgまでとする。	未定 (再審査期間:2019年6月25日まで)
ポリコナゾール錠50mg, 錠100mg, 錠200mg「アメル」	ブイフェンド錠50mg, 錠200mg	【用法・用量】 小児(2歳以上12歳未満及び12歳以上で体重50kg未満) ポリコナゾール注射剤による投与を行った後、通常、ポリコナゾールとして1回9mg/kgを1日2回食間に経口投与する。なお、患者の状態に応じて、又は効果不十分の場合には1mg/kgずつ増量し、忍容性が不十分の場合には1mg/kgずつ減量する(最大投与量として350mgを用いた場合は50mgずつ減量する)。 ただし、1回350mg1日2回を上限とする。 小児(12歳以上で体重50kg以上) ポリコナゾール注射剤による投与を行った後、通常、ポリコナゾールとして1回200mgを1日2回食間に経口投与する。なお、患者の状態に応じて、又は効果不十分の場合には1回300mg1日2回まで増量できる。	申請中 (再審査期間:2018年9月25日まで)
		造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防	未定 (再審査期間:2019年8月23日まで)
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg, 錠5mg「アメル」	ガスモチン錠2.5mg, 錠5mg	経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸X線造影検査前処置の補助	未定 (特許期間:2020年9月27日まで)
ラベプラゾールNa錠10mg「アメル」	パリエット錠10mg	低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制	未定 (再審査期間:2018年12月25日まで)
ラモトリギン錠25mg, 錠100mg「アメル」	ラミクタール錠25mg, 錠100mg	小児てんかん患者における単剤療法(定型欠神発作)	未定 (再審査期間:2019年9月23日まで)
リスペリドン錠0.5mg, 1mg, 2mg「アメル」、リスペリドンOD錠0.5mg, 1mg, 2mg「アメル」、細粒1%、内用液1mg/mL、内用液分包0.5mg, 1mg, 2mg	リスパダール錠1mg, 2mg、リスパダールOD錠0.5mg, 1mg, 2mg、リスパダール細粒1%、内用液1mg/mL	小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	未定 (再審査期間:2020年2月28日まで)
リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「アメル」	アクトネル錠17.5mg ベネット錠17.5mg	骨ページェット病	未定 (再審査期間:2018年7月15日まで)
ロスバスタチン錠2.5mg, 5mg「アメル」 ロスバスタチンOD錠2.5mg, OD錠5mg「アメル」	クレストール錠2.5mg, 5mg クレストールOD錠2.5mg, OD錠5mg	家族性高コレステロール血症	未定 (特許期間:2021年11月16日まで)