

医療関係者の皆様へ

フルコナゾール カプセル 50mg「アメル」

フルコナゾール カプセル 100mg「アメル」

ボリコナゾール 錠 50mg「アメル」

ボリコナゾール 錠 100mg「アメル」

ボリコナゾール 錠 200mg「アメル」

2016年10月

●● 共和薬品工業株式会社

フルコナゾールカプセル「アメル」および ボリコナゾール錠「アメル」処方時の重要なお願い

これらの薬剤は、ワルファリンの代謝を阻害します。併用により、ワルファリンの血中濃度が上昇し、プロトロンビン時間の延長や、出血傾向（挫傷、鼻出血、消化管出血、血尿、下血等）を引き起こす事があります。

これらの薬剤を患者様に処方する際には、以下の対応をお願いします。

- 必ずワルファリンの服用の有無を事前に確認してください。
- ワルファリンと併用する場合は、プロトロンビン時間の測定や、トロンボテストの回数を増やすなど慎重に投与してください。

なお、異常が認められ、併用を中止する場合には、これらの薬剤を中止し、ワルファリンの投与継続を優先してください。

お問い合わせ先：共和薬品工業株式会社 安全管理部

大阪市淀川区西中島 5-13-9 TEL06-6308-3388