

クエチアピン錠 12.5 mg 「アメル」
 クエチアピン錠 25 mg 「アメル」
 クエチアピン錠 50 mg 「アメル」
 クエチアピン錠 100 mg 「アメル」
 クエチアピン錠 200 mg 「アメル」
 クエチアピン細粒 10% 「アメル」
 クエチアピン細粒 50% 「アメル」

【この薬は？】

販売名	クエチアピン錠12.5mg 「アメル」 Quetiapine Tab. 12.5mg 「AMEL」	クエチアピン錠25mg 「アメル」 Quetiapine Tab. 25mg 「AMEL」	クエチアピン錠50mg 「アメル」 Quetiapine Tab. 50mg 「AMEL」
一般名	クエチアピソフマル酸塩 Quetiapine Fumarate		
含有量	1錠中 14.39 mg (クエチアピンとして 12.5 mg)	1錠中 28.78 mg (クエチアピンとして 25 mg)	1錠中 57.57mg (クエチアピンとして 50 mg)

販売名	クエチアピン 錠100mg 「アメル」 Quetiapine Tab. 100mg 「AMEL」	クエチアピン 錠200mg 「アメル」 Quetiapine Tab. 200 mg 「AMEL」	クエチアピン 細粒10% 「アメル」 Quetiapine Fine Granules 10% 「AMEL」	クエチアピン 細粒50% 「アメル」 Quetiapine Fine Granules 50% 「AMEL」
一般名	クエチアピソフマル酸塩 Quetiapine Fumarate			
含有量	1錠中 115.13mg (クエチアピン として 100 mg)	1錠中 230.26mg (クエチアピン として 200 mg)	1g 中 115.13mg (クエチアピン として 100 mg)	1g 中 575.65mg (クエチアピン として 500 mg)

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」

<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、精神神経用剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、脳内の神経伝達物質の受容体に作用してそのバランスを整えます。
- ・次の病気の人に処方されます。

統合失調症

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 血糖値が著しく上昇し、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡状態（激しいのどの渇き、吐き気、嘔吐（おうと）、腹痛、深く大きい呼吸、判断力の低下）などの重篤な状態になり、死亡にいたる可能性があるため、この薬の使用中は、血糖値の測定などがおこなわれることがあります。
- 患者や家族の方は、高血糖症状（激しいのどの渇き、水やジュースをたくさん飲む、尿の量が多い、尿の回数が多い）や低血糖があらわれることがあることを十分に理解できるまで説明を受けてください。このような症状があらわれた場合には、この薬を飲むのをやめて、ただちに受診してください。
- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・昏睡の状態にある人
 - ・バルビツール酸誘導体などの中枢神経抑制剤の強い影響下にある人
 - ・アドレナリン（ボスミン）を使用している人（アドレナリンをアナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く）
 - ・過去にクエチアピン錠・細粒「アメル」に含まれる成分で過敏症のあった人
 - ・糖尿病の人、または過去に糖尿病と診断されたことがある人
- 次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
 - ・肝臓に障害がある人

- ・心臓や血管の病気のある人、脳血管障害のある人、低血圧のある人、またはこれらの疑いのある人
- ・てんかんなどのけいれんを起こす病気のある人、また過去に起こしたことがある人
- ・死にたいと強く思ったり考えたりしたことがある人
- ・高齢の人
- ・血縁に糖尿病になった人がいる人、高血糖の人あるいは肥満の人など糖尿病になりやすい人

○この薬には併用してはいけない薬〔アドレナリン（アナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く）（ボスミン）〕や併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は次のとおりです。

販売名	クエチアピン錠12.5mg 「アメル」			クエチアピン錠25mg 「アメル」			クエチアピン錠50mg 「アメル」		
1日量	初期量 4～6錠	維持量 12～48錠	最高量 60錠	初期量 2～3錠	維持量 6～24錠	最高量 30錠	初期量 —	維持量 3～12錠	最高量 15錠
回数	1日量を2～3回に分けて飲みます。								

販売名	クエチアピン錠100mg 「アメル」			クエチアピン錠200mg 「アメル」		
1日量	初期量 —	維持量 2～6錠	最高量 7錠	初期量 —	維持量 1～3錠	最高量 3錠
回数	1日量を2～3回に分けて飲みます。					

クエチアピン錠「アメル」は1日に750mgを超えて飲まないでください。

販売名	クエチアピン細粒10% 「アメル」			クエチアピン細粒50% 「アメル」		
1日量	初期量 0.5～ 0.75g	維持量 1.5～ 6.0g	最高量 7.5g	初期量 0.1～ 0.15g	維持量 0.3～ 1.2g	最高量 1.5g
回数	1日量を2～3回に分けて飲みます。					

クエチアピン細粒10%「アメル」は1日に7.5gを超えて飲まないでください。

クエチアピン細粒50%「アメル」は1日に1.5gを超えて飲まないでください。

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分を飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

傾眠（ぼんやりする）、鎮静（静かになる）、頻脈（胸がドキドキする）、低血圧などの症状があらわれる可能性があります。また、昏睡、死亡に至ることが報告されています。いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、使用を中止し、ただちに受診してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・血糖値が著しく上昇し、糖尿病性ケトアシドーシスや糖尿病性昏睡などの重篤な状態になり、死亡にいたる可能性があるため、この薬の使用中は、血糖値の測定が行われることがあります。また、口渇、多飲、多尿、頻尿などの症状に注意してください。このような症状があらわれた場合には、薬を飲むのをやめて、ただちに受診してください。特に高血糖、肥満など糖尿病になりやすい人では注意してください。
- ・低血糖があらわれることがあるため、この薬の使用中は、脱力感、倦怠感、冷汗、振戦、傾眠、意識障害などの低血糖症状に注意してください。このような症状があらわれた場合には、薬を飲むのをやめて、ただちに受診してください。また、血糖値の測定などが行われることがあります。
- ・患者や家族の方は、高血糖や低血糖があらわれることがあることを十分に理解できるまで説明を受けてください。
- ・体重が増加することがあるため、肥満に注意してください。体重が増加し始めた場合には、医師に相談してください。食事療法や運動療法などが行われます。
- ・服用を始めてしばらくの間、起立性低血圧を起こすことがあるため、立ちくらみ、めまいなどの低血圧の症状があらわれた場合には、医師に相談してください。
- ・眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こることがあるため、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- ・薬の量を急激に減らしたり中止したりすることで、不眠、悪心（吐き気）、頭痛、下痢、嘔吐などの離脱症状があらわれることがあります。この薬の使用を中止する場合には、徐々に減量されます。医師の指示どおりに使用してください。
- ・抗精神病薬を飲んでいる人において、肺塞栓症（突然の息切れ）、静脈血栓症（下肢のむくみ・はれ）などが報告されています。長時間動かないでじっとしている人、長期間病床にある人、肥満の人、脱水状態の人は特にこれらの症状に注意して下さい。
- ・アルコール飲料はこの薬に影響しますので、控えてください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳を中止してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。




このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。



重大な副作用	主な自覚症状
糖尿病性ケトアシドーシス とうりょうびょうせいケトアシドーシス	意識の低下、考えがまとまらない、深く大きい呼吸、手足のふるえ、判断力の低下
糖尿病性昏睡 とうりょうびょうせいこんすい	激しいのどの渇き、吐き気、嘔吐（おうと）、腹痛、下痢、意識がなくなる
高血糖 こうけつとう	からだがだるい、脱力感、のどの乾き、水を多く飲む、尿の量が増える、体重が減る
低血糖 ていけつとう	ふらつき、脱力感、冷や汗、めまい、頭痛、動悸（どうき）、空腹感、手足のふるえ
悪性症候群（Syndrome malin） あくせいしょうこうぐん（シンドロームマリン）	38℃以上の発熱、ふるえ、意識がうすれる、考えがまとまらない、判断力が低下する、飲み込みにくい、筋肉のこわばり
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	脱力感、手のしびれ、手足のこわばり、足のしびれ、筋肉の痛み、尿が赤褐色になる
痙攣 けいれん	けいれん
無顆粒球症 むかりゅうきゅうしょう	発熱、のどの痛み
白血球減少 はっけつきゅうげんしょう	発熱、のどの痛み
肝機能障害 かんきのうしょうがい	からだがだるい、白目が黄色くなる、吐き気、嘔吐（おうと）、食欲不振、かゆみ、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿が褐色になる
麻痺性イレウス まひせいイレウス	吐き気、嘔吐（おうと）、激しい腹痛、食欲不振、腹がはる、便がでない
遅発性ジスキネジア ちはつせいジスキネジア	意志に反して舌を動かしたり、出し入れしたり・絶えず嚙むような口の動き、意志に反して体が動く
肺塞栓症 はいそくせんしょう	突然の息切れ、胸の痛み、血を吐く
深部静脈血栓症 しんぶじょうみやくけっせんしょう	手足の爪が青紫色～暗紫色になる、下肢の痛みとはれ、下肢のむくみ

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。
これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	からだがだるい、脱力感、38℃以上の発熱、発熱、ふるえ、けいれん、ふらつき、冷や汗、意志に反して体が動く、体重が減る
頭部	考えがまとまらない、意識の低下、意識がうすれる、判断力が低下する、めまい、頭痛
眼	白目が黄色くなる
口や喉	激しいのどの渇き、吐き気、嘔吐（おうと）、飲み込みにくい、のどの痛み、意志に反して舌を動かしたり・出し入れしたり・絶えず嚙むような口の動き、血を吐く、のどの渇き、水を多く飲む
胸部	深く大きい呼吸、吐き気、動悸（どうき）、突然の息切れ、胸の痛み
腹部	吐き気、腹痛、激しい腹痛、食欲不振、腹がはる、空腹感
手・足	手足のふるえ、手足のこわばり、手のしびれ、足のしびれ、下肢のむくみ、手足の爪が青紫色～暗紫色になる、下肢の痛みとはれ
皮膚	皮膚が黄色くなる、かゆみ
筋肉	筋肉のこわばり、筋肉の痛み
便	下痢、便がでない
尿	尿の色が濃くなる、尿が褐色になる、尿が赤褐色尿になる、尿の量が増える
その他	判断力の低下、意識がなくなる

【この薬の形は？】

販売名	クエチアピン錠12.5mg 「アメル」	クエチアピン錠25mg 「アメル」	クエチアピン錠50mg 「アメル」
形状	フィルムコーティング錠 	フィルムコーティング錠 	フィルムコーティング錠 
直径	6.1mm	6.1mm	7.6mm
厚さ	2.9mm	3.3mm	3.3mm
重さ	89.0mg	104.0mg	150.0mg
色	白色～帯黄白色	うすい黄みの赤色	微黄色
識別コード	Que アメル 12.5	Que アメル 25	Que アメル 50

販売名	クエチアピン錠 100mg「アメル」	クエチアピン錠 200mg「アメル」	クエチアピン細粒 10%「アメル」	クエチアピン細粒 50%「アメル」
形状	フィルムコーティング錠 	フィルムコーティング錠 	細粒剤	細粒剤
直径	8.6mm	11.1mm	—	—
厚さ	4.4mm	5.5mm	—	—
重さ	256.0mg	509.8mg	—	—
色	うすい黄色	白色～帯黄白色	淡赤色	白色
識別コード	Que アメル 100	Que アメル 200	—	—

【この薬に含まれているのは？】

販売名	クエチアピン錠12.5mg 「アメル」	クエチアピン錠25mg 「アメル」	クエチアピン錠50mg 「アメル」
有効成分	クエチアピソフマル酸塩		
添加物	乳糖水和物、リン酸水素カルシウム水和物、結晶セルロース、ポビドン、デンプン、グリコール酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、カルナウバロウ	乳糖水和物、リン酸水素カルシウム水和物、結晶セルロース、ポビドン、デンプン、グリコール酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄、カルナウバロウ	乳糖水和物、リン酸水素カルシウム水和物、結晶セルロース、ポビドン、デンプン、グリコール酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ

販売名	クエチアピン錠 100mg 「アメル」	クエチアピン錠 200mg 「アメル」	クエチアピン細粒 10% 「アメル」	クエチアピン細粒 50% 「アメル」
有効成分	クエチアピンプマル酸塩			
添加物	乳糖水和物、リン酸水素カルシウム水和物、結晶セルロース、ポビドン、デンプングリコール酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ	乳糖水和物、リン酸水素カルシウム水和物、結晶セルロース、ポビドン、デンプングリコール酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、カルナウバロウ	D-マンニトール、部分アルファー化デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、アセスルファムカリウム、スクラロース、エチルセルロース、タルク、三二酸化鉄、軽質無水ケイ酸	D-マンニトール、部分アルファー化デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、アセスルファムカリウム、スクラロース、タルク、軽質無水ケイ酸

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：共和薬品工業株式会社 (<http://www.kyowayakuhin.co.jp/>)

お問い合わせ窓口

フリーダイヤル：0120-041-189

受付時間：9時～17時30分

（土、日、祝日、その他当社の休業日を除く）