

くすりのしおり

620004450

2007年6月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：アncioチル錠 500mg

主成分：フルシトシン（Flucytosine）

剤形：白色の素錠 直径：約 10.1mm 厚さ：約 6.0mm

シート記載：表：Ancotil500mg、ロゴマーク、027

裏：アncioチル 500mg、KW027、アncioチル 500mg、
リサイクルマーク



この薬の作用と効果について

病気の原因となる真菌(カビの一種)の増殖を抑えることにより、感染症を治療します。

通常、真菌血症、真菌性髄膜炎、真菌性呼吸器感染症、黒色真菌症、尿路真菌症、消化管真菌症など深在性(内臓)真菌症の治療に使用されます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・ 血液障害、腎障害、肝障害がある。
- ・ 妊娠または授乳中、妊娠している可能性がある。
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は** << >> : 医療担当者記入
- ・ **真菌血症、真菌性髄膜炎、真菌性呼吸器感染症、黒色真菌症**には
通常、成人は主成分として1日量体重1kgあたり100～200mgを4回に分けて服用しますが、治療を受ける疾患や年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
尿路真菌症、消化管真菌症には
通常、成人は主成分として1日量体重1kgあたり50～100mgを4回に分けて服用しますが、治療を受ける疾患や年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・ 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合(4時間以内)は飲まずに、次の服用時間から1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、食欲低下、吐き気、発疹、下痢、運動時の動悸、息切れ、全身倦怠感、鼻血、歯ぐきの出血、皮下出血、日光による過度の日焼けなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・ 発熱、のどの痛み、手足に赤い点やあざが出来る [汎血球減少]
- ・ 発熱、のどの痛み、口内炎 [無顆粒球症]
- ・ 尿の量が減った、手足や顔のむくみ、全身倦怠感 [腎不全]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については、薬を受け取った薬局や医療機関に相談してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。