

くすりのしおり

620007994

2012年10月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力がが必要です。

商品名：エパロース粒状カプセル 600mg

主成分：イコサペント酸エチル（Ethyl icosapentate）

剤形：軟カプセル剤（微黄色透明の直径約 4.0mm の球形）を分包したもの

シート記載：表 エパロース粒状カプセル 600mg、600

裏 リサイクルマーク



この薬の作用と効果について

血液中の脂肪分（コレステロールや中性脂肪）を低下させます。血液の固まりがでるのを防いだり、血管の壁に付着するのを抑えます。血管の弾力性を保ちます。

通常、閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、疼痛および冷感の改善や高脂血症の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。出血している（血友病、毛細血管脆弱症、消化管潰瘍、尿路出血、喀血、硝子体出血）。手術を予定している。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は<<< :医療担当者記入>>
- ・閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、疼痛および冷感：通常、成人は1回1包（主成分として600mg）を1日3回、食直後に服用しますが、年齢・症状により適宜増減されます。
- ・高脂血症：通常、成人は1回主成分として900mgを1日2回、または1回1包（600mg）を1日3回、食直後に服用しますが、トリグリセリドの値が異常な場合には、必要に応じて1回900mg、1日3回まで増量されます。
- ・いずれの場合も、必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・空腹時に服用すると吸収が悪くなりますので、食直後に服用してください。
- ・本剤は手に移さないで直接袋から口に入れてください。軟カプセル剤のため、かむと油状の主成分がでてしまいますので、かまずに飲んでください。
- ・開封するときは、切り口を上にして静かに開けてください（中の薬が飛び散らないように注意して全部取り出してください）。
- ・お湯などの温かい飲み物に、本剤を混ぜないでください。
- ・飲み忘れた場合は、忘れた分は飲まないで、次の服用時間に1回分を飲んでください。2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ・高脂血症の場合には、指導された食事療法や運動療法をきちんと守ってください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、発疹、かゆみ、貧血、悪心、腹部不快感、下痢、腹痛、胸やけなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児・小児の手の届かないところで、光、高温（車の中などを含む）、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。