

## くすりのしおり

621949501  
2009年11月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

### 商品名：サルポグレラート塩酸塩錠 50mg 「アメル」

主成分：サルポグレラート塩酸塩（Sarpogrelate hydrochloride）  
剤形：白色のフィルムコーティング錠（直径約 6.6mm、厚さ約 3.3mm）  
シート記載：表 サルポグレラート塩酸塩 50mg「アメル」、50、Sarpogrelate HCl  
裏 Sarpogrelate HCl 50mg《AMEL》、KW SA 50、サルポグレラート塩酸塩「アメル」、50、リサイクルマーク



### この薬の作用と効果について

血小板や血管のセロトニン受容体に対する拮抗作用により、血小板の凝集や血管収縮を抑制し、血を固まりにくくし血流を良くします。これにより末梢循環障害による手足の痛み・冷感、潰瘍などの症状を改善します。

通常、慢性動脈閉塞症に伴う潰瘍、虚血性諸症状の治療に用いられます。

### 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。出血している（血友病、毛細血管脆弱症、消化管潰瘍、尿路出血、咯血、硝子体出血など）。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）

### 用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は** ：医療担当者記入
- ・ 通常、成人は1回1錠（主成分として100mg）を1日3回食後に服用しますが、年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・ 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばしてください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのをやめないでください。

### 生活上の注意

### この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、吐き気、胸やけ、腹痛、かゆみ、じんましん、発疹、紅斑、出血（鼻出血、皮下出血など）、肝機能障害などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・ 頭痛、吐き気、嘔吐 [脳出血]
- ・ 腹痛、黒い便が出る、血を吐く [消化管出血]
- ・ 鼻血、歯ぐきの出血、手足のあざ [血小板減少]
- ・ 全身けん怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる [肝機能障害、黄疸]
- ・ のどの痛み、頭痛、高熱 [無顆粒球症]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

### 保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。