

## くすりのしおり

621950001  
2010年1月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

### 商品名：ジクロフェナク Na テープ 30mg 「日医工」

主成分：ジクロフェナクナトリウム（Diclofenac sodium）

剤形：はだ色の貼付剤、10cm×14cm

シート記載：ジクロフェナクナトリウムテープ 30mg



### この薬の作用と効果について

皮膚から吸収され、患部における炎症や痛みの原因とされるプロスタグランジンという生体内の物質ができる量を減らすことにより炎症や腫れ、筋肉や関節の痛みを軽くします。

通常、変形性関節症、肩関節周囲炎、筋肉痛、腰痛症などの鎮痛、消炎に使用されます。

### 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。アスピリン喘息またはその既往歴、気管支喘息がある。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

### 用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は** ：医療担当者記入
- ・ 通常、1日1回患部に貼ります。必ず指示された使用方法に従ってください。
- ・ 粘膜や傷口、湿疹や発疹のあるところには使用しないでください。
- ・ 汗をかいているときはふき取り、お風呂あがりには汗がおさまってから貼ってください。
- ・ 貼るときは、はがれないように皮膚になじむまでテープ全体をしっかりと押さえてください。
- ・ 貼り忘れた場合は気がついたときに貼ってください。
- ・ 誤って多く貼った場合は多く貼った薬をはがして、貼った部分をよくふき取ってください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で使うのを止めないでください。

### 生活上の注意

#### この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、皮膚炎（発疹、かぶれ）、かゆみ、発赤、皮膚のあれ、刺激感などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・ 使用部位の発疹、腫れ、水ぶくれ [接触皮膚炎]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

#### 保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、光、高温を避けて保管してください。開封後は袋の開いている部分を折り曲げて保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。