

くすりのしおり

622091501
2011年11月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：エバスタチン OD錠 5mg「アメル」

主成分：エバスタチン（Ebastine）

剤形：薄い紅色の素錠、直径 6.5mm、厚さ 2.6mm

シート記載：表 エバスタチン OD5mg「アメル」、Kw EBA OD5、エバスタチン OD 5、

OD 5

裏 EbastineOD5mg《AMEL》、Kw EBA OD5、エバスタチン OD「アメル」、

OD 5

、リサイクルマーク



この薬の作用と効果について

アレルギーを起こす物質（ヒスタミン）の働きをおさえ、アレルギーやその症状（くしゃみ、鼻水、鼻づまり、湿疹、かゆみなど）を改善します。

通常、じんま疹、湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症、アレルギー性鼻炎の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・ あなたの用法・用量は◀ : 医療担当者記入▶
- ・ 通常、成人は1回1～2錠（主成分として5～10mg）を1日1回服用しますが、治療を受ける疾患や年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・ この薬は水と一緒になくても飲めるタイプの薬です。舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲んでください。普通の薬と同じように、コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲むこともできます。
- ・ 飲み忘れた場合は、気がついた時すぐに1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は忘れた分は飲まないで、次の指示された時間から飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ・ 眠気をもよおすことがありますので、車の運転や高所での作業、危険をとまなう機械の操作などには十分注意してください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、眠気、口渇、倦怠感、胃部不快感、発疹、浮腫、じんま疹などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・ 冷や汗、顔面蒼白、呼吸困難 [ショック、アナフィラキシー様症状]
- ・ 全身倦怠感、食欲不振、皮膚や結膜などの黄染 [肝機能障害、黄疸]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。