

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：塩酸プロピペリン錠 10mg 「アメル」

主成分：プロピペリン塩酸塩（Propiverine hydrochloride）

剤形：白色～淡黄白色のフィルムコーティング錠、直径約 7.1mm、厚み約 3.0mm

シート記載：表：Propiverine HCL 10mg 《AMEL》、Propiverine HCL 10

裏：塩酸プロピペリン 10mg「アメル」、KW511、塩酸プロピペリン「アメル」10、リサイクルマーク



この薬の作用と効果について

抗コリン作用およびカルシウム拮抗作用により、膀胱平滑筋の異常収縮を抑制し、膀胱容量を増加させます。通常、尿意切迫感・頻尿・尿失禁の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。便秘、胃・腸アトニー（胃腸が弱い）、尿がでにくい、緑内障、筋無力症、心疾患、不整脈、肝障害、腎障害、パーキンソン症状、脳血管障害、潰瘍性大腸炎、甲状腺機能亢進症
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は** ：医療担当者記入
- ・ 通常、成人は 1 回 2 錠（主成分として 20mg）を 1 日 1 回食後に服用します。年齢・症状により適宜増減され、効果不十分の場合は 1 回 2 錠を 1 日 2 回まで増量されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・ 飲み忘れた場合は、気がついた時できるだけ早く 1 回分を飲んでください。ただし、次の服用時間まで 8 時間以上あけるようにしてください。次の通常服用する時間が近い場合は、忘れた分は飲まずに 1 回分をとばしてください。絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。
- ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ・ 目のかすみ、眠気、めまいなどがあらわれることがあるので、車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、口渇、便秘、悪心、腹痛、排尿困難、残尿感、目のかすみ、意識障害、手足のふるえ、舌のもつれ、徐脈、かゆみ、発疹、じんましんなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・ はきけ、頭痛を伴う眼痛、視力低下 [急性緑内障発作]
- ・ 便秘、腹が張る [麻痺性イレウス]
- ・ 筋肉痛、脱力感、赤褐色尿 [横紋筋融解症]
- ・ 発熱、紅斑（皮膚の赤い発疹）、眼の充血 [皮膚粘膜眼症候群]
- ・ 胸痛、動悸、息切れ [QT 延長、心室性頻拍]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。