

くすりのしおり

内服剤

2016年04月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。


商品名：カンデサルタン錠 8mg 「アメル」

主成分：カンデサルタン シレキセチル (Candesartan cilexetil)

剤形：ごくうすいだい色の錠剤、直径約 7.0mm、厚さ約 2.7mm

シート記載：（表）カンデサルタン、8mg 「アメル」、8

（裏）Candesartan 8mg 《AMEL》、カンデサルタン、8mg 「アメル」、高血圧症治療剤、リサイクルマーク、GS1 コード



この薬の作用と効果について

血管を収縮して血圧を上げたり、心不全を悪化させたりする体内の物質であるアンジオテンシン II の受容体に拮抗し、末梢血管の抵抗を低下させて血圧を下げます。また、心不全の予後を改善します。

通常、高血圧症や軽症～中等症の慢性心不全の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。血中カリウム濃度が高い、手術前、血液透析をしている、減塩療法中、血中ナトリウム濃度が低い、心臓疾患、腎障害、肝障害がある。
- ・妊娠中、妊娠している可能性がある、授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

・あなたの用法・用量は<<< :医療担当者記入>>

・高血圧症：通常、成人は1回0.5～1錠（主成分として4～8mg）を1日1回を服用します。必要に応じ1回1.5錠（12mg）を1日1回まで増量されます。腎障害がある場合は、1回2mgを1日1回から服用を開始し、必要に応じ1回1錠（8mg）を1日1回まで増量されます。

腎実質性高血圧症：通常、成人は1回2mgを1日1回から服用を開始し、必要に応じて1回1錠（8mg）を1日1回まで増量されます。

慢性心不全（軽症～中等症）：通常、成人は主成分として1日1回4mgから服用を開始し、必要に応じ1日1回8mgまで増量されます。なお、少量より服用を開始する必要がある患者では、1日1回2mgから服用が開始されます。

本剤は1錠中に主成分8mgを含む製剤です。いずれの場合も、必ず指示された服用方法に従ってください。

- ・飲み忘れた場合は、気が付いたときに1回分を飲んでください。ただし、次の服用時間まで8時間以上あけるようにしてください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ・血圧が下がりすぎることにより、めまい、ふらつきがあらわれることがありますので、高所での作業、車の運転など危険をとまなう機械の操作などには十分注意してください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、発疹、かゆみ、光線過敏症、めまい、ふらつき、立ちくらみ、動悸、ほてり、頭痛、頭重感、不眠、眠気、舌のしびれ、吐き気、嘔吐、食欲不振、胃部不快感、みぞおちの痛み、下痢、口内炎、貧血、倦怠感、脱力感、鼻出血、頻尿、浮腫、咳、湿疹、蕁麻疹などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・尿量が減る、顔や手足がむくむ、熱が出る [急性腎不全]
- ・皮膚や白目が黄色くなる、体がだるい、食欲不振 [肝機能障害、黄疸]
- ・脱力感、筋肉痛、褐色の尿 [横紋筋融解症]
- ・発熱、から咳、息苦しい [間質性肺炎]
- ・冷や汗が出る、空腹感、手のふるえ [低血糖]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。