

# くすりのしおり

内服剤

2017年06月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 商品名：アリピプラゾール内用液 6mg 分包「タカタ」

主成分：アリピプラゾール(Aripiprazole)

剤形：無色澄明の経口液剤

シート記載：（表）アリピプラゾール内用液 6mg 分包「タカタ」、6mg/包（6mL）（裏）  
アリピプラゾール内用液 6mg 分包「タカタ」、6mg/包（6mL）



## この薬の作用と効果について

脳内の神経伝達物質であるドパミンなどの受容体に作用して、ドパミン神経のバランスを調整します。幻覚や妄想、不安感や緊張感、意欲の低下などの症状を改善します。

通常、統合失調症の治療に用いられます。

## 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。糖尿病またはその既往歴や家族歴がある、肝障害、心・血管疾患、低血圧、てんかんなどの痙攣性疾患またはその既往歴がある、自殺を図ったまたは思いめぐらせている。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人は1日1～2包（主成分として6～12mg）を1～2回に分けて服用を開始し、維持用量として1日1～4包（6～24mg）を1～2回に分けて服用します。年齢・症状により適宜増減されますが、1日5包（30mg）を超えません。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れに気付いたらすぐに1回分を服用してください。ただし、次の服用時間が近い場合にはその時に服用せずに、次に服用する時間に1回分を服用してください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

## 生活上の注意

- ・眠気が起きたり、注意力、集中力、反射運動能力などの低下が起こることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。
- ・アルコールは、薬の作用を強めることがありますので、飲酒は控えてください。

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、不眠、神経過敏、アカシジア（じっとしていることができない）、振戦（手足の震え）、不安、体重減少、筋強剛、食欲不振などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・口が渇く、よく水を飲む、糖尿病の悪化による昏睡 [糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡]
- ・急激な発熱、筋肉の強張り、手足の震え [悪性症候群]
- ・吐き気・嘔吐、便がでない、激しい腹痛 [麻痺性イレウス]
- ・手足の筋肉の痛み、全身の倦怠感、赤褐色尿 [横紋筋融解症]
- ・脱力感、寒気、動悸 [低血糖]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局や医療機関にご相談ください。

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。