

くすりのしおり

660433031

2007年5月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：スクロードパスタ

主成分：精製白糖（Sucrose）
ポビドンヨード（Povidone-iodine）

剤形：褐色の軟膏剤

シート記載：



この薬の作用と効果について

褥瘡（床ずれ）、皮膚潰瘍の治療を促進します。薬の成分によって患部に新しい肉芽や血管・表皮の形成を促進します。また、殺菌作用があり、患部を菌から守ります。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・ 甲状腺機能に異常がある、腎臓が悪い。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は** << >> **：医療担当者記入**
- ・ 通常、症状に及び病巣の広さに応じて適量を使用する。潰瘍面を清拭後、1日1～2回ガーゼにのぼして貼付するか、または直接塗布しその上をガーゼで保護する。必ず指示された使用方法に従ってください。
- ・ 使い忘れた場合は、気がついた時にすぐに使ってください。ただし、次に使う時間が近い場合には忘れた分を抜き、次回より指示どおり使ってください。絶対に2回分を一度に使ってはけません。
- ・ 誤って多く使用した場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で使うのを止めないでください。

生活上の注意

- ・ 衣類、装身具などに付着したらすぐに洗い落としてください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、痛み、赤くなる、ヒリヒリ感、かゆみなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・ 顔面蒼白、冷汗、立ちくらみ、めまい、息切れ、意識消失など [ショック]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- ・ 直射日光または高温を避けて保管ください。
- ・ 乳幼児、小児の手の届かない所に保管してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。