

スルピリド細粒 50%「アメル」の安定性に関する資料

(無包装)

本資料は、苛酷条件に保存した場合の安定性試験結果をお示しするものです。
一包化や粉碎の可否につきましては、医療機関様にてご判断いただきますよう、お願いいたします。

試験方法

各試験方法は承認規格に準拠。

総合評価分類

分類	分類基準
◎	全ての試験項目で変化を認めない
○	いずれかの試験項目で「規格内」の変化を認める
△	いずれかの試験項目で「規格外」の変化を認める

評価基準

【外観】

分類	評価基準	判定
変化なし	外観上の変化を、ほとんど認めない場合	◎
変化あり (規格内)	わずかな色調変化 (退色等) 等を認めるが、品質上、問題とならない程度の変化であり、規格を満たしている場合	○
変化あり (規格外)	形状変化や著しい色調変化を認め、規格を逸脱している場合	△

【溶出性】又は【崩壊性】

分類	評価基準	判定
変化なし	規格値内の場合	◎
変化あり (規格外)	規格値外の場合	△

【含量】

分類	評価基準	判定
変化なし	含量低下が 3%未満の場合	◎
変化あり (規格内)	含量低下が 3%以上で、規格値内の場合	○
変化あり (規格外)	規格値外の場合	△

【その他の試験項目】

分類	評価基準	判定
変化なし	規格値内の場合	◎
変化あり (規格外)	規格値外の場合	△

平成 11 年 8 月 20 日付「錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について (答申)」(日本病院薬剤師会) 一部改変

1. 総合評価

検体：スルピリド細粒 50%「アメル」

保存条件※1		検体	包装形態	30 日目	60 日目	90 日目
湿度	25±1℃ 75±5%RH	細粒剤	遮光・開放	◎	◎	○
温度	40±1℃		遮光・気密容器	○	◎	○

保存条件※1		検体	包装形態	60 万 lx・hr
光	25±1℃ (曝光量) 60 万 lx・hr※2	細粒剤	気密容器	◎

※1：平成 11 年 8 月 20 日付「錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験について(答申)」(日本病院薬剤師会)に準じる。

※2：病院薬局における調剤時の保存条件を反映し、500lx の明るさの場所で 1 日 8 時間、1 ヶ月 25 日間照射されるとして 6 ヶ月間に相当する。(500lx×8 時間×25 日間×6 ヶ月=60 万 lx・hr)

無包装状態の場合

無包装状態における安定性は、25℃75%RH の湿度条件下において、90 日目までいずれの試験項目においても規格値の範囲内であった。

また、温度 (40℃) 90 日間、光 (60 万 lx・hr) の条件下においても、いずれの試験項目においても規格値の範囲内であった。

2. 湿度に対する試験項目および安定性試験結果

① 外観

開始時	30 日目	60 日目	90 日目
白色の細粒剤で味はわずかに苦かった。	変化なし	変化なし	変化なし
判定	◎	◎	◎

規格値：白色の細粒剤で、味はわずかに苦い。

② 溶出性

開始時	30 日目	60 日目	90 日目
91.7～92.1 (91.8)	91.5～92.5 (92.1)	90.4～92.0 (91.1)	91.8～93.3 (92.5)
判定	◎	◎	◎

規格値：45分=80%以上、最小値～最大値、()内は6ベッセルの平均値(%)

③ 含量

開始時	30 日目	60 日目	90 日目
101.0 (100.0)	99.3 (98.3)	98.5 (97.5)	96.9 (95.9)
判定	◎	◎	○

規格値：93.0～107.0% ()内は開始時を100%として換算した値 3回の平均値(%)

3. 温度に対する試験項目および安定性試験結果

① 外観

開始時	30 日目	60 日目	90 日目
白色の細粒剤で味はわずかに苦かった。	変化なし	変化なし	変化なし
判定	◎	◎	◎

規格値：白色の細粒剤で、味はわずかに苦い。

② 溶出性

開始時	30 日目	60 日目	90 日目
91.7～92.1 (91.8)	91.9～93.1 (92.8)	90.7～91.6 (91.1)	91.1～92.9 (91.9)
判定	◎	◎	◎

規格値：45分=80%以上、最小値～最大値、()内は6ベッセルの平均値(%)

③ 含量

開始時	30 日目	60 日目	90 日目
101.0 (100.0)	96.6 (95.6)	98.5 (97.5)	96.6 (95.6)
判定	○	◎	○

規格値：93.0～107.0% ()内は開始時を100%として換算した値 3回の平均値(%)

4. 光に対する試験項目および安定性試験結果

① 外観

開始時	60 万 lx・hr
白色の細粒剤で味はわずかに苦かった。	変化なし
判定	◎

規格値：白色の細粒剤で、味はわずかに苦い。

② 溶出性

開始時	60 万 lx・hr
91.7～92.1 (91.8)	93.0～94.9 (93.9)
判定	◎

規格値：45 分=80%以上、最小値～最大値、()内は 6 ベッセルの平均値(%)

③ 含量

開始時	60 万 lx・hr
101.0 (100.0)	99.2 (98.2)
判定	◎

規格値：93.0～107.0% ()内は開始時を 100%として換算した値 3 回の平均値(%)