

# ジアゼパム散 1% 「アメル」の安定性に関する資料

## (無包装)

本資料は、苛酷条件に保存した場合の安定性試験結果をお示しするものです。  
一包化や粉碎の可否につきましては、医療機関様にてご判断いただきますよう、お願いいたします。

### 試験方法

各試験方法は承認規格に準拠。

### 総合評価分類

分類	分類基準
◎	全ての試験項目で変化を認めない
○	いずれかの試験項目で「規格内」の変化を認める
△	いずれかの試験項目で「規格外」の変化を認める

### 評価基準

#### 【外観】

分類	評価基準	判定
変化なし	外観上の変化を、ほとんど認めない場合	◎
変化あり (規格内)	わずかな色調変化 (退色等) 等を認めるが、品質上、問題とならない程度の変化であり、規格を満たしている場合	○
変化あり (規格外)	形状変化や著しい色調変化を認め、規格を逸脱している場合	△

#### 【溶出性】又は【崩壊性】

分類	評価基準	判定
変化なし	規格値内の場合	◎
変化あり (規格外)	規格値外の場合	△

#### 【含量】

分類	評価基準	判定
変化なし	含量低下が 3%未満の場合	◎
変化あり (規格内)	含量低下が 3%以上で、規格値内の場合	○
変化あり (規格外)	規格値外の場合	△

#### 【その他の試験項目】

分類	評価基準	判定
変化なし	規格値内の場合	◎
変化あり (規格外)	規格値外の場合	△

平成 11 年 8 月 20 日付「錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について (答申)」(日本病院薬剤師会) 一部改変

## 1. 総合評価

検体：ジアゼパム散 1%「アメル」

保存条件※1		検体	包装形態	30日目	60日目	90日目
湿度	25±1℃ 75±5%RH	散剤	遮光・開放	○	○	○
温度	40±1℃		遮光・気密容器	◎	◎	◎

保存条件※1		検体	包装形態	60万 lx・hr
光	25±1℃ (曝光量) 60万 lx・hr※2	散剤	気密容器	◎

※1：平成11年8月20日付「錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験について(答申)」(日本病院薬剤師会)に準じる。

※2：病院薬局における調剤時の保存条件を反映し、500lxの明るさの場所で1日8時間、1ヵ月25日間照射されるとして6ヵ月間に相当する。(500lx×8時間×25日間×6ヵ月=60万 lx・hr)

**無包装状態の場合**

無包装状態における安定性は、25℃75%RHの湿度条件下において、90日目までいずれの試験項目においても規格値の範囲内であった。

また、温度(40℃)90日間、光(60万 lx・hr)の条件下においても、いずれの試験項目においても規格値の範囲内であった。

## 2. 湿度に対する試験項目および安定性試験結果

## ① 外観

開始時	30 日目	60 日目	90 日目
白色の散剤であった。	変化なし	変化なし	変化なし
判定	◎	◎	◎

規格値：白色の散剤である。

## ② 溶出性

開始時	30 日目	60 日目	90 日目
86.9～94.0 (90.5)	87.7～88.7 (88.3)	83.3～87.2 (86.1)	81.8～88.3 (85.5)
判定	◎	◎	◎

規格値：120 分=70%以上、最小値～最大値、( )内は 6 ベッセルの平均値(%)

## ③ 含量

開始時	30 日目	60 日目	90 日目
97.2 (100.0)	91.3 (93.9)	91.7 (94.3)	91.0 (93.6)
判定	○	○	○

規格値：90～110% ( )内は開始時を 100%として換算した値 3 回の平均値(%)

## 3. 温度に対する試験項目および安定性試験結果

## ① 外観

開始時	30 日目	60 日目	90 日目
白色の散剤であった。	変化なし	変化なし	変化なし
判定	◎	◎	◎

規格値：白色の散剤である。

## ② 溶出性

開始時	30 日目	60 日目	90 日目
86.9～94.0 (90.5)	93.0～96.6 (95.1)	91.2～92.7 (91.9)	91.6～94.6 (93.2)
判定	◎	◎	◎

規格値：120 分=70%以上、最小値～最大値、( )内は 6 ベッセルの平均値(%)

## ③ 含量

開始時	30 日目	60 日目	90 日目
97.2 (100.0)	96.1 (98.9)	97.2 (100.0)	97.4 (100.2)
判定	◎	◎	◎

規格値：90～110% ( )内は開始時を 100%として換算した値 3 回の平均値(%)

## 4. 光に対する試験項目および安定性試験結果

## ① 外観

開始時	60 万 lx・hr
白色の散剤であった。	変化なし
判定	◎

規格値：白色の散剤である。

## ② 溶出性

開始時	60 万 lx・hr
86.9～94.0 (90.5)	90.8～92.2 (91.4)
判定	◎

規格値：120 分=70%以上、最小値～最大値、( )内は 6 ベッセルの平均値(%)

## ③ 含量

開始時	60 万 lx・hr
97.2 (100.0)	95.8 (98.6)
判定	◎

規格値：90～110% ( )内は開始時を 100%として換算した値 3 回の平均値(%)