

— 大切な注意です。必ずお読みください —

# クロピドグレル錠 25mg「アメル」

# クロピドグレル錠 75mg「アメル」

を服用される患者さんへ

このお薬は血栓(血のかたまり)ができて血管がつまるのを防ぐお薬です。

このお薬を飲んで、いつもと違う以下のような症状に気がいたら、ただちに医師または薬剤師に連絡し、指示に従ってください。

- 皮膚が黄色くなる
- 皮膚にあざができたり、ぶつぶつができる
- 白眼が黄色くなる
- 気分が悪い  
はきけがする
- 強い疲労感、  
食欲低下がある
- うとうとする、  
意識が低下する
- 鼻や歯ぐきからの  
出血がある
- 尿が茶色っぽくなる
- かぜのような症状  
(熱が出る、さむけがする、  
のどが痛む)

このお薬の服用にあたっては、医師・薬剤師の指示に従い、薬の飲み方を守ってください。

(裏面もお読みください)

- 1日1回服用してください。
- 空腹時の服用はさけてください。
- 飲み忘れたとしても、次の日に2回分を一度に服用しないでください。
- 飲みはじめの2ヵ月間は、まれに肝障害や血液障害などの副作用が起きることがあるので、定期的に血液検査などが行われることがあります。
- 手術や歯の治療を受ける時には、クロピドグレル錠「アメル」を服用していることを医師に必ず伝えてください。
- 誤って他の人が服用することがないように厳重に保管してください。
- 飲み残したお薬はすべて廃棄してください。
- 症状が軽くなったように感じても、医師の指示がある間は服用を続けてください。自分の判断でお薬を飲むのをやめたり、お薬の量を減らしたりすると、再発することがあります。医師の指示する期間、きちんと服用を続けてください。

ご連絡先：