

クロピドグレル錠 25mg「アメル」

クロピドグレル錠 75mg「アメル」

を服用される患者さんへ

診察を受ける病院・医院をかわったときや、
他の病院・医院（診療科）を受診するときは、
このカードをお見せください。

氏名

クロピドグレル（ mg錠× 錠/日）

服用開始日：平成 年 月 日

医療機関名：

TEL （ ）

（裏面もお読みください）

このお薬は血栓(血のかたまり)ができて血管がつまるのを防ぐお薬です。

このお薬を飲んで、いつもと違う以下のような症状に気がついたら、ただちに医師または薬剤師に連絡し、指示に従ってください。

- 皮膚が黄色くなる
- 皮膚にあざができたり、ぶつぶつができる
- 白眼が黄色くなる
- 気分が悪い
はきけがする
- 強い疲労感、
食欲低下がある
- うとうとする、
意識が低下する
- 鼻や歯ぐきからの
出血がある
- 尿が茶色っぽくなる
- かぜのような症状
(熱が出る、さむけがする、
のどが痛む)

このお薬の服用にあたっては、医師・薬剤師の指示に従い、薬の飲み方を守ってください。

- 1日1回服用してください。
- 空腹時の服用はさけてください。
- 飲み忘れたとしても、次の日に2回分を一度に服用しないでください。
- 飲みはじめの2ヵ月間は、まれに肝障害や血液障害などの副作用が起きることがあるので、定期的に血液検査などが行われることがあります。
- 手術や歯の治療を受ける時には、クロピドグレル錠「アメル」を服用していることを医師に必ず伝えてください。
- 誤って他の人が服用することがないよう厳重に保管してください。
- 飲み残したお薬はすべて廃棄してください。
- 症状が軽くなったように感じていても、医師の指示がある間は服用を続けてください。自分の判断でお薬を飲むのをやめたり、お薬の量を減らしたりすると、再発することがあります。医師の指示する期間、きちんと服用を続けてください。