

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2013年11月

精神活動改善剤  
パーキンソン症候群治療剤  
抗A型インフルエンザウイルス剤

処方せん医薬品 注意—医師等の処方せんにより使用すること

**トーフアルミン<sup>®</sup>錠50**  
**トーフアルミン<sup>®</sup>錠100**  
**トーフアルミン<sup>®</sup>細粒10%**

(アマンタジン塩酸塩錠・細粒)

発売元

共和薬品工業株式会社  
大阪市淀川区西中島5-13-9

製造販売元

キョーリンリメディオ株式会社  
富山県南砺市井波885番地

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、アマンタジン塩酸塩製剤 トーフアルミン錠50・トーフアルミン錠100・トーフアルミン細粒10%の「使用上の注意」を自主改訂致しましたのでご連絡申し上げます。

すでにお手元にある製品のご使用に際しましては、下記の改訂内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。  
謹白

### 改訂内容 ( \_\_\_\_\_ : 自主改訂箇所)

改訂後	改訂前 (==== は削除部分)
<b>【使用上の注意】</b> <b>4. 副作用</b> (1) <b>重大な副作用</b> (頻度不明) 1)、2) 一省略— 3) <b>視力低下を伴うびまん性表在性角膜炎、<u>角膜浮腫様症状</u></b> ：このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。 4)～7) 一省略—	<b>【使用上の注意】</b> <b>4. 副作用</b> (1) <b>重大な副作用</b> (頻度不明) 1)、2) 一省略— 3) <b>視力低下を伴うびまん性表在性角膜炎、<del>角膜上炎</del>浮腫様症状</b> ：このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。 4)～7) 一省略—

改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報No.225」(2013年12月発送予定)に掲載される予定です。なお、改訂後の添付文書は共和薬品工業株式会社(<http://www.kyowayakuhin.co.jp/amel-di/>)、キョーリンリメディオ株式会社(<http://www.kyorin-rmd.co.jp/>)のホームページ及び医薬品医療機器情報提供ホームページ(<http://www.info.pmda.go.jp/>)に掲載致します。併せてご利用下さい。

以上