

～ このお薬をのむ前にお読みください ～

注意していただきたいこと

患者さんによっては、このお薬の服用中に血糖値の上昇や低下がみられることがあります。いずれの状態も放っておくと危険です。

服用中に次のような症状がみられた場合には、お薬の服用をやめて、すぐに主治医の先生に連絡して受診してください。


血糖値が高いときにみられる症状

- のどが激しく渴く
- 水やジュースをたくさん飲む
- 尿の量が多くなる
- トイレの回数が多くなる



血糖値が低いときにみられる症状

- 急に強い空腹感をおぼえる
- 力のぬけた感じがする
- 冷や汗がでる
- 手足がふるえる



(裏面もご覧ください)

- ▶ 主治医の先生の指示により、血糖値を測定することがあります。
- ▶ 糖尿病の方や、糖尿病と言われたことがある方は、このお薬を服用することはできません。
- ▶ ご家族や親族に糖尿病の人がいる方、血糖値が高いと言われたことがある方、肥満傾向の方は、血糖値が上昇しやすいので、特に注意してください。

その他の注意

- ▶ このお薬の服用中に、**体重が増加**することがあります。体重が増え始めた場合には、主治医の先生に相談し、食事内容を改善したり、適度な運動をするよう心がけましょう。
- ▶ 自分の判断でのむのを中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。主治医の先生の指示どおりに服用してください。



ここには、このお薬について特に注意していただきたいことだけを書いています。

他にこのお薬について分からないことがあれば、主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。