

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

## 使用上の注意改訂のお知らせ

マイナートランキライザー

**ジアゼパム錠2「アメル」**

**ジアゼパム錠5「アメル」**

**ジアゼパム散「アメル」**

DIAZEPAM

〈ジアゼパム製剤〉

2003年12月  
共和薬品工業株式会社

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、この度、『**ジアゼパム錠2「アメル」、錠5「アメル」/散「アメル」**』の【使用上の注意】を改訂いたしますので、ご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。  
今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

### 【改訂内容】（下線 ――― 部自主改訂箇所）

改 訂 後			現行添付文書（2002年5月改訂）
3.相互作用 (1)併用禁忌（併用しないこと） - 現行のとおり -  (2)併用注意（併用に注意すること）			3.相互作用 (1)併用禁忌（併用しないこと） - 略 -  (2)併用注意（併用に注意すること） - 略 - 「シプロフロキサシン」、「マレイン酸フルボキサミン」の記載なし
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	
シプロフロキサシン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が増強することがある。	本剤のクリアランスがシプロフロキサシンとの併用により低下することが報告されている。	
マレイン酸フルボキサミン	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が増強することがある。	本剤の代謝が阻害されることにより本剤のクリアランスが低下することが報告されている。	
- 現行のとおり -			

### 【改訂理由】

自主改訂

《参考文献》

- ・ Kamali, F., et al.: Eur. J. Clin. Pharmacol., 44:365(1993)
- ・ Perucca, E., et al.: Clin. Pharmacol. Ther., 56:471(1994)

問い合わせ先：共和薬品工業株式会社 薬事・PMS室 大阪市淀川区西中島5-13-9 TEL06-6308-3388