

－ 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－

使用上の注意改訂のお知らせ

混合ビタミン注射液

サブビタン静注

製造販売元 **共和クリティケア株式会社**
神奈川県厚木市旭町四丁目 18 番 29 号

発売元 **共和薬品工業株式会社**
大阪市淀川区西中島 5-13-9

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度、「サブビタン静注」につきまして、下記のとおり【使用上の注意】を改訂致しますのでご案内申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。
今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

●改訂内容（ _____ 部改訂箇所、 _____ 部削除箇所）

改訂後	改訂前
<p>【使用上の注意】</p> <p>3. 適用上の注意</p> <p>(1) アンフルカット時：本品は一点カットアンフルを使用しているため、アンフルカット時にはヤスリを用いず、アンフル頭部のマークが真上にくるように持ち、反対側へ折ること。なお、カット時に異物混入を避けるため、カット部分をエタノール綿等で清拭し、カットすることが望ましい。</p> <p>(2) 調製時：本剤は、<u>アミノ酸製剤と混合した場合、ビタミンの分解が促進されることがあるので注意すること。</u></p> <p>(3) 投与速度：静脈内投与により血管痛を起こすことがあるため、注射速度はできるだけ遅くすること。</p> <p>(4) 投与時：ビタミンの光分解を防ぐため、<u>遮光カバー（橙黄褐色ポリエチレン製カバー等）で輸液瓶又は輸液バッグを被覆して使用すること。</u></p>	<p>【使用上の注意】</p> <p>3. 適用上の注意</p> <p>(1) 静脈内投与時：静脈内投与により血管痛を起こすことがあるため、注射速度はできるだけ遅くすること。</p> <p>(2) アンフルカット時：本品は一点カットアンフルを使用しているため、アンフルカット時にはヤスリを用いず、アンフル頭部のマークが真上にくるように持ち、反対側へ折ること。なお、カット時に異物混入を避けるため、カット部分をエタノール綿等で清拭し、カットすることが望ましい。</p>

【改訂理由】

本剤と同一成分である製品において「適用上の注意」が改訂されたことに伴い、本剤の「適用上の注意」に調製時及び投与時の注意について追記致しました。

●本情報はDSU(医薬品安全対策情報)No. 261(2017年7月下旬予定)に掲載されます。

●添付文書情報は「医薬品医療機器総合機構ホームページ(URL : <http://www.pmda.go.jp/>)」に掲載致します。
また、「共和薬品工業ホームページ (URL <http://www.kyowayakuhin.co.jp/amel-di/>)」にも掲載致します。