



# ラバミコム<sup>®</sup>配合錠「アメル」

を服用される患者さんへ

ラバミコム配合錠「アメル」を服用中の方で、以下のような症状が起きた場合には、この薬による過敏症（アレルギー症状）の可能性があります。このような症状があらわれたら、主治医の先生にご相談ください。

## 1 発疹

## 2 次の4つのグループのうち2つ以上のグループにあてはまる症状が起こった場合

- ①発熱
- ②胃腸症状（吐き気、嘔吐、おうと下痢、腹痛等）
- ③ねむけ、倦怠感、けんたいかん筋肉や関節の痛み、頭痛
- ④呼吸器症状（息切れ、のどの痛み、せき等）



\*この薬でアレルギー症状が起きて服用を中止した場合、その後もう一度この薬を飲むと非常に重いアレルギー症状が起きる場合があります。アレルギー症状と思われる症状があらわれた場合は、必ず主治医や薬剤師に相談してください。

\*この薬によるアレルギー症状については、必ず主治医や薬剤師から詳しい説明をしてもらってください。

上記以外の症状が起きる場合もありますので、異常を感じたら必ず主治医や薬剤師に相談してください。自覚症状はなくても、肝機能検査値異常やコレステロール異常が起こることもありますので、必ず定期的に病院に通いましょう。


(裏面もご覧ください)

# 【キャップの開け方】

キャップは、子供が開けにくいように特別な加工を施したチャイルドロック式となっています。

## ●開け方

下図のように①キャップを上から強く押しながら、②反時計回り(左)に回すとキャップが開きます。回す時、カチカチと音がする場合は、キャップは外れていません。



## ●閉め方

- ①キャップが止まるまで時計回り(右)に回して閉めます。
- ②キャップを反時計回り(左)に回してカチカチと音がすれば閉まった状態です。