

# ラバミコム<sup>®</sup>配合錠「アメル」を服用する患者さんへ

あなたの担当医師の電話番号 ※このカードは必ず常に携帯してください

病院・医院名：

---

診療科名：

---

担当医師名： TEL( )

---

担当医師名： TEL( )

---

先生方へ

重篤な症状が発現した場合には、血管ならびに気道等を確保した上で血圧及び呼吸の管理につとめ、経過観察を行うなどの一般的な対症療法を実施してください。

共和薬品工業株式会社

02LBM\*C01Z01  
作成年月 2019年8月

アバカビルを成分として含む薬を服用すると、**過敏症(アレルギー症状)**が起こる場合があります。過敏症が起きた患者さんがラバミコム®配合錠「アメル」の服用を続けると、生命にかかわる重大な事態となる場合があります。**次のような場合は、ただちに担当医師に連絡し、服用を中止するべきかどうか指示を受けてください。**

1. 発疹が起こった場合
2. 下記の4つのグループのうち2つ以上のグループにあてはまる症状が起こった場合

発熱	ねむけ、倦怠感、筋肉や関節の痛み、頭痛
吐き気、嘔吐、下痢、腹痛	息切れ、のどの痛み、せき

このような過敏症のためにこの薬の服用を中止した場合は、**その後絶対にアバカビル含有製剤を服用しないでください。**このような過敏症を経験した人がこの薬を再び服用すると、数時間以内により強い過敏症の症状があらわれ、生命にかかわるほどの血圧低下が発現したり、死に至るおそれがあります。