

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

## 使用上の注意改訂のお知らせ

抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤、片頭痛治療剤  
処方箋医薬品

日本薬局方バルプロ酸ナトリウム錠

**バルプロ酸ナトリウム錠 100mg「アメル」**  
**バルプロ酸ナトリウム錠 200mg「アメル」**

SODIUM VALPROATE

抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤、片頭痛治療剤  
処方箋医薬品

日本薬局方バルプロ酸ナトリウム徐放錠A

**バルプロ酸ナトリウムSR錠 100mg「アメル」**  
**バルプロ酸ナトリウムSR錠 200mg「アメル」**

SODIUM VALPROATE SR

抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤、片頭痛治療剤  
処方箋医薬品

**バルプロ酸ナトリウム徐放U顆粒 40%「アメル」**〔製造販売元：共和クリティケア(株)〕

SODIUM VALPROATE

〈バルプロ酸ナトリウム徐放製剤〉

2020年3月

 共和薬品工業株式会社

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、『バルプロ酸ナトリウム錠 100mg、錠 200mg「アメル」』、『バルプロ酸ナトリウム SR 錠 100mg、SR 錠 200mg「アメル」』及び『バルプロ酸ナトリウム徐放U顆粒 40%「アメル」』の【使用上の注意】を改訂致しますので、ご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

・バルプロ酸ナトリウム錠 100mg、錠 200mg「アメル」、バルプロ酸ナトリウム SR 錠 100mg、SR 錠 200mg「アメル」

【改訂内容】(下線—部 追加改訂箇所)

「該当事項のみ記載」

改 訂 後			現行添付文書 (普通錠 2019 年 3 月改訂、 SR 錠 2019 年 10 月改訂)		
<b>3. 相互作用</b> (2) 併用注意(併用に注意すること)			<b>3. 相互作用</b> (2) 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ラモトリギン	—現行のとおり—	—現行のとおり—	ラモトリギン	—略—	—略—
ロラゼパム (注射剤)	左記薬剤の消失半減期が延長することがある。	肝におけるグルクロン酸抱合が競合する。	サリチル酸系薬剤 アスピリン等	—略—	—略—
ベンゾジアゼピン系薬剤 ジアゼパム等 ワルファリンカリウム	左記薬剤の作用が増強することがある。	遊離型の左記薬剤の血中濃度を上昇させる。	ベンゾジアゼピン系薬剤 ジアゼパム等 ワルファリンカリウム	左記薬剤の作用が増強することがある。	遊離型の左記薬剤の血中濃度を上昇させる。
サリチル酸系薬剤 アスピリン等	—現行のとおり—	—現行のとおり—			
バルプロ酸ナトリウム錠 100mg、錠 200mg「アメル」の場合 <b>4. 副作用</b> (2) その他の副作用			バルプロ酸ナトリウム錠 100mg、錠 200mg「アメル」の場合 <b>4. 副作用</b> (2) その他の副作用		
	頻度不明			頻度不明	
過敏症	発疹		過敏症	発疹	
泌尿器	夜尿・頻尿、血尿、尿失禁		その他	倦怠感、夜尿・頻尿、鼻血、口渇、浮腫、月経異常(月経不順、無月経)、発熱、血尿、高アンモニア血症、歯肉肥厚、体重増加、尿失禁、多嚢胞性卵巣、カルニチン減少	
生殖器	月経異常(月経不順、無月経)、多嚢胞性卵巣				
その他	倦怠感、鼻血、口渇、浮腫、発熱、高アンモニア血症、歯肉肥厚、体重増加、カルニチン減少				

(裏面につづく)

